

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор ФГБУ «РНЦРР»

Минздрава России

академик РАН, д.м.н., профессор

В.А. Солодкий

«8» сентября 2020 г.



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации о научно-практической значимости докторской диссертации Жуманиёзова Хикмата Ибрагимовича на тему: «Дифференцированный подход к лечению детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.

Актуальность темы выполненной работы

Диссертационная работа Жуманиёзова Х.И. посвящена актуальной теме клинической онкологии – разработке дифференциированного подхода к лечению детей с рабдомиосаркомой мочеполовой системы. На долю рабдомиосарком приходится 4 – 8% от всех злокачественных новообразований детского возраста и, несмотря на относительно невысокую частоту встречаемости, проблема лечения детей с рабдомиосаркомами стоит остро и на настоящий момент является предметом многочисленных исследований. Приблизительно 20% рабдомиосарком первично исходит из органов мочеполовой системы, поражая преимущественно детей в возрасте от 2-4 и 15-19 лет. Еще несколько лет назад основным методом лечения детей с рабдомиосаркомой считался хирургический, но излечивалось не более 10% детей. В настоящее время методом выбора принята комплексная терапия, включающая различные режимы неоадьювантной химиотерапии для пациентов с первично

неоперабельной опухолью, либо первичное хирургическое вмешательство, лучевая терапия.

В мировой литературе имеется ограниченное количество публикаций о комплексных подходах к лечению детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы, что ведет к применению большого количества различных подходов и ухудшению результатов лечения в целом. Вопросы выбора оптимальных комбинаций химиопрепаратов, интенсивности химиотерапии, объемов и сроков проведения лучевой терапии, объемов хирургических вмешательств, а так же проблема побочных эффектов хирургии и лучевой терапии на область таза у детей, остаются не до конца решенными к настоящему времени.

В связи с этим, научное исследование автора, направленное на разработку тактики лечения детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы в зависимости от группы риска с целью увеличения безрецидивной выживаемости при сокращении отдаленных побочных эффектов терапии является актуальным, своевременным, перспективным и востребованным для клинической онкологии.

Связь с планами соответствующих отраслей науки

Тема диссертации Жуманиёзова Х.И. «Дифференцированный подход к лечению детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы» выполнялась в соответствии с планом научно – исследовательских работ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, а также соответствует задачам федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Целью данного исследования являлась разработка тактики лечения детей с локализованной и местнораспространенной эмбриональной рабдомиосаркомой мочеполовой системы в зависимости от группы риска с целью увеличения безрецидивной выживаемости при сокращении отдаленных побочных эффектов терапии.

В представленном исследовании автором впервые в России и странах СНГ на репрезентативном клиническом материале всесторонне проведено изучение значимости стратификации пациентов с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой органов мочеполовой системы по клиническим группам, стадиям и группам риска, дана оценка факторам, влияющим на частоту рецидивов и результаты лечения. Доказано, что включение дополнительных препаратов в терапию группы низкого риска не улучшает результатов лечения, но при этом увеличивает непосредственную токсичность и создает предпосылки для развития отдаленных побочных явлений. В группе промежуточного риска включение препаратов циклофосфамид или ифосфамида достоверно увеличивает выживаемость пациентов по сравнению с двухкомпонентной схемой, но не влияет на результаты лечения первичных пациентов. Определено место лучевой терапии в терапии детей с рабдомиосаркомой мочеполовой системы и оптимальные сроки ее начала, показана возможность снижения интенсивности химиотерапии в группе пациентов низкого риска, что в перспективе позволит снизить риск развития отдаленных побочных эффектов. Определена хирургическая и терапевтическая тактика в отношении резидуальных опухолей, сохраняющихся на фоне проведения индукции.

На основании проведенного исследования показано влияние правильного распределения пациентов по группам риска в зависимости от первоначальной стадии и клинической группы (объема проведенной первичной операции) на общую и безрецидивную выживаемость.

Диссертационная работа имеет большое значение для практического здравоохранения, так как предложены практические рекомендации по лечению детей с локализованной и местнораспространенной эмбриональной рабдомиосаркомой мочеполовой системы.

Достоверность выводов и результатов исследования

Работа выполнена на большом клиническом материале. Использованные в работе методы и экспериментальные модели адекватны поставленным задачам. Выводы логически вытекают из полученных результатов и обоснованы собственными и литературными данными. Представленный объем материала и проработка

значительного клинического материала с применением комплекса современных статистических методов, обеспечивают достоверность полученных результатов исследования и сформулированных выводов.

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации результатов

Результаты диссертационного исследования имеют существенное научно-практическое значение. На большом клиническом материале достоверно показано что, разработанный дифференцированный подход к лечению детей с локализованной и местнораспространенной эмбриональной рабдомиосаркомой мочеполовой системы в зависимости от группы риска влияет на общую и безрецидивную выживаемость. На основании полученных данных предложены практические рекомендации по лечению детей с локализованной и местнораспространенной эмбриональной рабдомиосаркомой мочеполовой системы. Результаты диссертационной работы внедрены в клиническую практику НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы

Результаты диссертационной работы внедрены в клиническую практику НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Результаты исследования следует использовать в клинической практике медицинских учреждений РФ, оказывающих специализированную помощь детям с онкологическими заболеваниями, а также в программах постдипломного образования с целью совершенствования качества подготовки специалистов.

Заключение

Диссертационная работа Жуманиёзова Хикмата Ибрагимовича «Дифференцированный подход к лечению детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы» является самостоятельным законченным научно-квалификационной исследованием, выполненным на современном методическом уровне. Работа содержит решение актуальной задачи клинической онкологии по разработке тактики лечения детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы.

По своей научной новизне, теоретической и практической значимости диссертационная работа соответствует всем требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – Онкология.

Диссертационная работа Жуманиёзова Х.И. «Дифференцированный подход к лечению детей с локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы» обсуждена на научно-практической конференции ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России «7 » сентябрь 2020 г., протокол №7.

Заместитель директора
по научно – лечебной работе
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
д.м.н., профессор

Павлов А.Ю.

Подпись д.м.н., профессора Павлова А.Ю. «ЗАВЕРЯЮ»

Ученый секретарь
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
д.м.н., профессор

Цаллагова З.С.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
117997, Москва, ул. Профсоюзная, д.86.
тел.: 8 (495)333-41-80
www.rncrr.ru, e-mail: mailbox@rncrr.rssi.ru;