

ИММУНОМОДУЛЯТОР ДЕТОКСИКАНТ АНТИОКСИДАНТ

Полиоксидоний®

Азоксимера бромид



Продолжение. Начало читайте на предыдущей странице

При динамическом исследовании параметров иммунного статуса при применении Полиоксидония отмечалась нормализация исходно измененных параметров, в сторону как увеличения, так и уменьшения показателей. При этом данная динамика была характерна и для функциональных параметров – наиболее чувствительных к проведению цитостатической терапии. Важно отметить способность Полиоксидония оказывать иммуномодулирующее действие не только на иммунорегуляторное (Т-клеточное) и противоопухолевое (NK-клетки) звенья иммунитета, что, несомненно, важно при онкологической патологии, но и на фагоцитирующие клетки. Последнее обстоятельство может быть полезным для профилактики инфекционных осложнений, развивающихся порой на фоне массивной химиотерапии.

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение Полиоксидония в интервалах между курсами химиотерапии сопровождается улучшением как основных, так и дополнительных показателей качества жизни больных онкологическими заболеваниями, а хорошая переносимость и незначительные побочные эффекты делают применение Полиоксидония в этой области перспективным. Режим удобен для амбулаторного применения и может быть рекомендован в качестве сопроводительной терапии онкологических больных¹⁻⁵.

1. Кадагидзе З.Г. Современные методы иммунотерапии в онкологии. Под ред. Хаитова Р.М., Атауллханова Р.И., Иммуноterapia, ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2011, глава 44, с. 562-583. 2. Феденко А.А. Влияние некоторых иммуномодуляторов на иммунную систему и переносимость адъювантной химио- или химиолучевой терапии у больных раком молочной железы: Автореф. дис. канд. мед. наук. М. 2007. 25 с. 3. Гордина Г.А., Короткова О.В., Киселев А.В. Иммуномодулятор Полиоксидоний в комплексном лечении детей с гистiocитозом из клеток Лангерганса и лимфомой Ходжкина, Иммунология, 2002, №4, С.228-230. 4. Артамонова Е.В., Короткова О.В., Заботина Т.Н. с соавт. Результаты применения Полиоксидония у больных раком молочной железы, Российский биотерапевтический журнал, 2005, Том 4, № 1, с.96-97. 5. Комарова Л.Е., Манзюк Л.В., Артамонова Е.В. с соавт. Влияние иммуномодулятора «Полиоксидоний» на качество жизни больных раком молочной железы, получающих адъювантную химиотерапию, Российский биотерапевтический журнал, 2004, Том 3, № 3, С. 72-77.

ООО «НПО Петровакс Фарм»

РФ, 142143, Московская обл., Подольский р-н, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1
Тел./факс: 8 (495) 329-17-18, 8 (495) 926-21-07. E-mail: info@petrovax.ru.


Реклама

 **НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ**
Препараты будущего – сегодня

ИММУНОЛОГИЯ
ГЕМОПОЭЗА

HAEMATOPOIESIS
IMMUNOLOGY

Н 2/2015



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ИММУНОМОДУЛЯТОР ДЕТОКСИКАНТ АНТИОКСИДАНТ

Полиоксидоний®

Азоксимера бромид



Реклама

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ПОЛИОКСИДОНИЙ®

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

иммуномодулирующее средство

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Иммуномодулирующее действие препарата Полиоксидоний® основано на прямом воздействии на фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, а также на стимуляции антителообразования. Полиоксидоний® восстанавливает иммунитет при вторичных иммунодефицитных состояниях, вызванных инфекциями, травмами, ожогами, аутоиммунными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, осложнениями после хирургических операций, применения химиотерапевтических средств, цитостатиков, стероидных гормонов.

Полиоксидоний® обладает выраженной детоксикационной и антиоксидантной активностью. Включение его в комплексную терапию онкологических больных уменьшает интоксикацию на фоне химио- и лучевой терапии, позволяет проводить стандартную терапию без изменения схемы в связи с развитием инфекционных осложнений и побочных эффектов. Препарат хорошо переносится, не обладает мутагенной, поликлональной активностью, антигенными свойствами, не оказывает алергизирующего, мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При внутримышечном введении Полиоксидоний® имеет высокую биодоступность; время достижения максимальной концентрации в крови – 40-60 минут. Выводится преимущественно почками. Кумулятивный эффект отсутствует.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ – коррекция иммунитета, дезинтоксикация. У взрослых в комплексной терапии онкологической патологии в процессе и после химио- и лучевой терапии для снижения иммуносупрессивного, нефро- и гепатотоксического действия лекарственных препаратов; для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений, активизации репаративных процессов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность, беременность, лактация.

Парентерально:

У онкологических больных:

- до и на фоне химиотерапии для снижения иммунодепрессивного, гепато- и нефротоксического действия химиотерапевтических средств по 6-12 мг через день курсом не менее 10 инъекций; далее частота введения определяется врачом в зависимости от переносимости и длительности химио- и лучевой терапии;

- для профилактики иммунодепрессивного влияния опухоли, для коррекции иммунодефицита после химио- и лучевой терапии, после хирургического удаления опухоли показано длительное применение препарата Полиоксидоний® (от 2-3 месяцев до 1 года) по 6-12 мг 1-2 раза в неделю.

Полиоксидоний® суппозитории 12 мг применяются ректально и вагинально 1 раз в сутки ежедневно в течение 3-х дней, затем через день курсом 10-20 суппозиториями. При необходимости курс лечения повторяют через 3-4 месяца.

Для больных, длительно получающих иммуносупрессивную терапию, онкологических, подвергшихся облучению, показана длительная от 2-3 месяцев до 1 года поддерживающая терапия Полиоксидонием (взрослым по 12 мг, детям старше 6 лет – по 6 мг 1-2 раза в неделю).

На фоне химио- и лучевой терапии опухолей рекомендуется – по 1 суппозиторию ежедневно за 2-3 дня до начала курса терапии. Далее частота введения суппозитория определяется врачом в зависимости от переносимости и длительности химио- и лучевой терапии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Полиоксидоний® совместим с антибиотиками, противовирусными, противогрибковыми и антигистаминными препаратами, бронхолитиками, глюкокортикостероидами, цитостатиками.

ООО «НПО Петровакс Фарм»
РФ, 142143, Московская обл., Подольский р-н, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1
Тел./факс: 8 (495) 329-17-18, 8 (495) 926-21-07. E-mail: info@petrovax.ru.

 **НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ**
Препараты будущего – сегодня

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ИММУНОМОДУЛЯТОР ДЕТОКСИКАНТ АНТИОКСИДАНТ

Полиоксидоний®

Азоксимера бромид



Влияние Полиоксидония на эффективность лечения онкологических больных, переносимость послеоперационной химиотерапии исследовалось при широком спектре злокачественных новообразований:

- рак молочной железы
- гистиоцитоз из клеток Лангерганса и лимфома Ходжкина
- рак толстой кишки
- рак гортани

Проведенные исследования показали:

- Полиоксидоний уменьшает побочные эффекты введения цитостатиков (тошноту, изжогу, неустойчивый стул, общую слабость и т.п.)
- Применение Полиоксидония в комбинированной терапии онкологических больных является полностью безопасным
- Полиоксидоний не оказывает влияния на особенности клинического течения и прогноз самого злокачественного заболевания
- Полиоксидоний хорошо переносится. Частота встречаемости побочных явлений не превышает таковую, указанную в инструкции медицинского применения препарата.

Продолжение читайте на следующей странице

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ